

TABELLE 8. INTENSITÄT DER SYMPTOME AM ENDE DES 6. MONATS FÜR VERSCHIEDENE REAKTIONSTUFEN			
Symptom	wenn sie an Reaktionsstufe leiden		
	schwere Reaktion	mittlere Reaktion	milde Reaktion
Gelenkschmerzen, Arthritis, Osteoarthritis	schwer	begrenzt	Leicht aber Knorpelabbau linkes Knie
allgemeine Schmerzen	intensiv, zunehmend	nein	nein
Sehnenentzündung	weit verbreitet	beschränkt auf wenige Stellen	leicht, lokal begrenzt
Muskelschmerzen, Steifigkeit	Hoch	Mittel	leicht oder gar nicht
Abheilen von physischen Traumata	eingeschränkt	normal	normal
Hautverletzungen, Ausschläge	häufig	manchmal	nein
kalte Hände/Füße, schlechte Durchblutung	sehr intensiv	einige Verschlechterungen	nein
Hirnprobleme	ja	nein	nein
Depersonilisation, <u>Panik-Attacken</u>	sehr häufig	üblich	nicht mehr seit 6 Mon.
Zucken, Taubheitsgefühl, Kribbeln	schwer	spürbar	nicht spürbar
Schlaflosigkeit, Angstzustände, <u>Gehirnnebel</u>	generell, stark	sehr häufig	häufig aber leicht
Sehen (Floater, Lichter, Blindpunkte)	sehr häufig	selten	unüblich
Lichtempfindlichkeit	generell	häufig	selten
Konzentrationsprobleme	möglich	selten	nein
Impotenz	steigend	nein	nein
Sensibilisierung für Lebensmittel, Chemikalien, Gerüche	sehr häufig	selten	nein
trockene Nebenhöhlen, trockenes Auge, trockenes Ohr, trockene Haut	ja	nein	nein
neurologische Krämpfe	ja	nein	nein
Herzklopfen, Herzrhythmusstörungen, Arrhythmien	Schlimmer werdend	Nur noch ganz selten	möglich
erhöhte Serumentzyme	ja	nein	nein
Tinnitus, Ohrenklingeln	häufig vorkommend	manchmal	nicht spürbar
periphere Neuropathien	generell schlimmer werdend,	häufig, begrenzt	unüblich
neue Symptome, die auftreten oder zunehmen.	bis zum 18. Monat	bis zum 14. Monat	nicht spürbar
Höhepunkt der Symptome (Abschwung)	nach 20. Monat	Anfang 17. Monat noch Brainfog	Anfangsmonate